

Nombre y Apellidos:

1) Identifique el material y asócielo con los rótulos de denominación y especie o especies que pueden alojar (Puntuación: 1 pts.) (Tiempo: 5 minutos).

2) Realice las operaciones siguientes.

A. Inmovilice el animal indicado

B. Libérelo y devuélvalo a la jaula

Ratón: para aplicar sonda oral

Cobaya: para exploración

Rata: para aplicar sonda oral

(Puntuación: 1,5 pts.) (Tiempo: 2 minutos)

3) Escoja los animales que se indican.

Ratón escoger 3 machos y 3 hembras

Cobaya: escoger un macho

(Puntuación: 2,5 pts.) (Tiempo: 3 minutos)

1) Documentación traslado de animales en Castilla y León. 1 pto

1.1. Equino: pasaporte, guía sanitaria y el certificado de desinfección del vehículo autorizado en Castilla y León. 0,5 ptos.

Solución

Falta el certificado de limpieza y desinfección del vehículo emitido por un Centro de limpieza autorizado.

1.2. Conejos de laboratorio: documento de entrega y el certificado/control sanitario del centro de procedencia. 0,5 ptos.

Solución

Falta el certificado/control sanitario del centro de procedencia.

2) Conducción y sujeción de una oveja para inmovilización completa: atada de las dos extremidades anteriores y de las dos posteriores. 2 ptos

Solución

1. Vestirse con ropa de trabajo: mono, calzas y guantes.
2. Trasladar la oveja de un lugar a otro: se sujeta con una mano una de las extremidades posteriores por encima del corvejón y con la otra mano se coge piel de la espalda y se va empujando suavemente con el cuerpo.
3. Derribar la oveja: agarrando la extremidad posterior y la extremidad anterior del lado contrario a donde está situado el operario; sujetar con la mano esas dos extremidades.
4. Inmovilizarla: cruzando las extremidades anteriores y posteriores del mismo lado y luego las del otro lado, de forma alterna. Se debe realizar a la altura de las cuartillas por ser la zona más delgada.
5. Atar las extremidades lo más fuerte posible.

2.1. Si tuviera que estar mucho tiempo atada, haría alguna modificación en este método.

Solución

Convendría atarla solo de tres extremidades, las dos posteriores y una anterior, dejar una de las anteriores libres, para que el pecho quede liberado y evitar que el animal pueda sufrir una congestión.

3) Sujeción de un potro neonato 2 ptos

Solución

1. Aguantarlo por el pecho con un brazo y por la base de la cola con la otra mano.
2. Si el potro intenta moverse o escapar, apretar la base de la cola, tirando de ella suavemente hacia arriba.
3. Cuando el potro se tranquiliza soltamos la presión.